FORMULARZ ZGODY

RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA

Radiofrekwencja mikroigowa (RFMN) – termolifting z mikronakłuwaniem, jest metodą stosowaną w medycynie estetycznej do zwiększania napięcia skóry, usuwania zmarszczek, blizn (szczególnie blizn po trądziku), usuwania rozstępów oraz wiotkiej skóry. Radiofrekwencja mikroigłowa polega na jednoczesnym nakłuwaniu skóry mikroigłami (grubości ok. 30g) oraz ogrzewaniu za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. Radiofrekwencja mikroigłowa to działanie na skórę falą elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, która poprzez ogrzewanie tkanki stymuluje jej regenerację. Ciepło (około 45-60 stopni C) powoduje uszkodzenie oraz obkurczanie włókien kolagenowych, a także indukuje procesy naprawy i tworzenia nowego kolagenu w miejscu włókien uszkodzonych. Mikronakłuwanie to z kolei działanie na skórę mikroigłami, które uszkadzając mechanicznie tkankę pobudzają jej regenerację. Połączenie obu wymienionych technik pozwala na osiągnięcie lepszych efektów, niż w przypadku stosowania każdej z tych metod osobno.
Radiofrekwencja mikroigłowa pozwala dokładnie określić zakres zabiegu poprzez nakłucie skóry na pożądaną głębokość max. 3.0 mm, a nawet do 8 mm (na ciało). Działa przy tym skuteczniej niż klasyczne lasery, które sięgają nie głębiej, niż 1,7 mm. W radiofrekwencji mikroigłowej dokładnie regulujemy nie tylko zasięg zabiegu, ale również czas oraz intensywność nagrzewania tkanek.
Wskazania do radiofrekwencji mikroigłowej – termoliftingu – obejmują:

- lifting skóry twarzy, szyi oraz brzucha – likwidacja wiotkiej skóry, redukcję rozstępów na udach, pośladkach, brzuchu oraz piersiach
- wiotkość skóry na brzuchu – po ciąży
- usuwanie blizn po trądziku
- spłycanie zmarszczek oraz bruzd, szczególnie umiejscowionych w trudnych okolicach
- odmłodzenie skóry rąk oraz stóp
- likwidacja cellulitu, modelowanie talii, kształtu brzucha, pośladków i nóg
- ujędrnianie i zwiększanie gęstości skóry m.in. twarzy, szyi oraz dekoltu
- leczenie nadmiernego pocenie się
- rozjaśnianie przebarwień
- cienie pod oczami
- opadające powieki

Tylko wiotkość skóry powiek, czyli mocno opadające powieki najskuteczniej leczy zabieg to: plastyka powiek.
Zabiegi można wykonywać bez znieczulenia, gdyż igły urządzania są tak cienkie, że ich wprowadzenie pod skórę jest praktycznie bezbolesne. Dla większego komfortu pacjentów zwykle używa się jednak żelu/kremu znieczulającego 20 minut przed zabiegiem.
Skrupulatnie wyznaczony i zdezynfekowany obszar skóry nakłuwa się matrycą mikroigiełek. Urządzenie posiada wygodną końcówkę, która płynnie wsuwa igły pod skórę. Następnie RF emituje energię według uprzednio ustawionych, dobranych indywidualnie parametrów na końcach tych igieł (izolowane, nieablacyjne) lub na całej ich długości (nieizolowane, ablacyjne). Pojedyncze przyłożenie nie trwa dłużej niż sekundę. W ten sposób zabieg wykonywany jest stopniowo i systematycznie na całym wyznaczonym obszarze.

Dające się przewidzieć następstwa zabiegu i możliwe powikłania:
Pomimo dużego doświadczenia i staranności ze strony zespołu zabiegowego w czasie zabiegu i po nim może dojść do powikłań, które przeważnie są natychmiast rozpoznawane i leczone. Wymienione powikłania mogą pojawić się w przebiegu pozabiegowym u każdego pacjenta/klienta, jednak ich ogólna częstość nie jest wysoka. Ich liczba zwiększa się u chorych na cukrzycę, pacjentów powtórnie operowanych i osób otyłych. Typowe dla okresu pozabiegowego objawy miejscowe:

- ból, rumień, obrzęk i krwawienie - ból jest zazwyczaj łagodny i podobny do zgłaszanego podczas mezoterapii mikroigłowej, rumień może na ogół trwać od 12 godzin do trzech do pięciu dni po zabiegu lub czasami dłużej niż 5 dni,
- obrzęk jest powszechny i wydaje się utrzymywać do 12 godzin po leczeniu, chociaż może trwać kilka dni lub dłużej, krwawienie punktowe może trwać dłużej niż po zastosowaniu innych metod leczenia mikroigłowego (nawet do 7 dni),
- blizny po igłach, w skutek nieprawidłowych parametrów czy złej techniki wykonania, a także/lub nadkażenia bakteryjnego, wirusowego,
- zdalna kompensacyjna nadpotliwość po RFMN z powodu leczenia nadmiernej potliwości pach
- zaburzenia czucia, w tym zdarzają się przypadki drętwienia trwający kilka godzin do kilku tygodni,
- łuszczenie się i tworzenie strupów jest rzadkie w przypadku RFMN choć może się pojawi,
- strupki, grudki i krostki są rzadkie ale również możliwe,
- zmiany pigmentacyjne,
- dysestezja (zaburzenia neurologiczne, które charakteryzuje się osłabieniem lub zmianą wrażliwości sensorycznej, zwłaszcza dotyku), związane z uszkodzeniem nerwu wywołanym ciepłem; zmiany czuciowe również w skutek nadkażenia bakteryjnego, wirusowego.

Podpis i data